







	Japanischer Staudenknöterich	Bastard-Staudenknöterich	Sachalin-Staudenknöterich
			
Blattgröße (Hauptspross)	10 –18cm lang, Blätter der Seitenzweige ähnlich groß bis etwas kleiner	20 –35cm lang, die Blätter der Seitenzweige deutlich kleiner	30 –45cm lang, die Blätter der Seitenzweige deutlich kleiner
Blattform	breit eiförmig	breit eiförmig bis länglich eiförmig	länglich eiförmig bis elliptisch
Blattbasis	gerade, rechtwinkelig gestutzt	gerade gestutzt oder etwas herzförmig	deutlich herzförmig gerundet
Blattspitze	aufgesetzt zugespitzt	aufgesetzt zugespitzt bis gerade spitz	gerade spitz
Blattbehaarung unterseits (insbes. auf den Nerven)			
	ohne Haare, nur mit rauen Papillen (so lang wie breit) besetzt	mit bis ca. 0,5 mm langen Haaren besetzt	mit 1–2 mm langen, weichen Haaren besetzt
Blattstruktur	dick und fest, ledrig	meist fest, aber nicht ledrig	dünn, weich
Stängelfarbe	viele kleine rotbraune Flecken	ohne oder mit undeutlichen rotbraunen Flecken	ohne rotbraune Flecken
Wuchshöhe	1,5–2,5 (–3) m	2,5–3,5 (–4) m	3,0–4,5 m